

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP SZKOLNY
20 listopada 2020 r., godz. 12.00



Uczennico/Uczniu:

1. Arkusz składa się z 25 zadań, na których rozwiązanie masz **90** minut.
2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.
3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną odpowiedź.
4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.
5. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów	40	100%
Uzyskana liczba punktów		%
Podpis Przewodniczącej/ego SKK		

Uwaga: w zadaniach 1.-8. i 10.-15. wybierz prawidłową odpowiedź poprzez wyraźne otoczenie pętlą jednej z liter: A, B, C lub D; w zadaniu 9. – jednej z liter A, B lub C.

Zadanie 1. (0-1 pkt.)

..... /1

Który zapis przedstawia mieszaninę jednorodną?



Zadanie 2. (0-1 pkt.)

..... /1

Zbiornik, którego objętość możemy regulować, zawiera 200 cm^3 gazu o masie 0,14 g. Jaka będzie masa gazu, gdy jego objętość zmniejszymy dwukrotnie?

A. 0,07 g

B. 0,21 g

C. 0,14 g

D. 0,28 g

Zadanie 3. (0-1 pkt.)

..... /1

Uczeń ogrzewał 45,62 g metalu i zaobserwował wzrost jego temperatury od $22,63^\circ\text{C}$ do $41,59^\circ\text{C}$. Jaki jest wzrost temperatury przypadający na 1 g metalu?

A. $2,406 \frac{\text{g}}{\text{K}}$

B. $0,496 \frac{^\circ\text{C}}{\text{g}}$


C. $0,4156 \frac{\text{K}}{\text{g}}$

D. $1,10 \frac{\text{g}}{^\circ\text{C}}$

Zadanie 4. (0-1 pkt.)

..... /1


Poniżej przedstawiono konfiguracje elektronowe dla czterech różnych pierwiastków. Który pierwiastek wykazuje najwyższą wartościowość w związku tworzonym z wodorem?



Zadanie 5. (0-1 pkt.)

..... /1

Kawałek metalu dodano do rozcieńczonego kwasu solnego. Przebiegła reakcja chemiczna. Na wykresie poniżej przedstawiono zależność masy metalu, która nie przereagowała, od czasu trwania reakcji.



Jaka masa metalu przereagowała po 60 sekundach?

A. 2 g

B. 4 g


C. 6 g

D. 8 g

Zadanie 6. (0-1 pkt.)

..... /1

Chloroform jest nierozpuszczalny w wodzie ani w etanolu (alkoholu etylowym). Woda i etanol mieszają się w dowolnych stosunkach. Gęstość chloroformu jest większa od gęstości wody oraz etanolu. Gęstość wody jest większa od gęstości etanolu. Który rysunek poprawnie przedstawia wygląd probówki do której wprowadzono równe objętości wody, etanolu i chloroformu, całość wstrząśnięto i pozostawiono na pewien czas?

**Zadanie 7.** (0-1 pkt.)

..... /1

Uczeń przeprowadził reakcję żelaza z siarką zmieszanych w stosunku masowym $\text{Fe} : \text{S} = 7 : 8$. Zanotował następujące obserwacje i wnioski:

Podczas prowadzenia reakcji:

- I. Mieszanina przyjmuje czarną barwę.
- II. Mieszanina rozżarza się.
- III. Powstaje siarczek żelaza(II).
- IV. Wydziela się ostry duszący zapach.
- V. Powstaje tlenek siarki(IV).
- VI. Jest to reakcja egzoenergetyczna.
- VII. Doświadczenie przeprowadza się pod dygestorium.
- VIII. Powstała substancja nie jest przyciągana przez magnes.

Zakreśl odpowiedź zawierającą wszystkie poprawne wnioski.

A. III, V, VIII

B. II, III, V, VIII

C. III, V, VI

D. III, V

Zadanie 8. (0-1 pkt.)

..... /1

Pewien związek o wzorze MgCr_2O_4 ma następujący masowy skład procentowy:

% Mg = 12,5 %

% Cr = 54,2%


% O = 33,3 %

Skład ten ilustruje/opisuje:

- A. prawo stałości składu związku chemicznego
- B. prawo zachowania masy
- C. prawo zachowania ładunku
- D. prawo Avogadra

Zadanie 9.

Poniższy wykres przedstawia zmiany masy tlenu i masy chromu w próbkach trzech różnych tlenków chromu: czerwonym tlenku chromu, zielonym tlenku chromu i czarnym tlenku chromu, o różnych masach.



Zadanie 9.1. (0-1 pkt.)

..... /1

Który tlenek chromu charakteryzuje się największym udziałem masowym chromu w związku?

- A. czerwony tlenek chromu B. zielony tlenek chromu C. czarny tlenek chromu

Zadanie 9.2. (0-1 pkt.)

..... /1

W wyniku reakcji 10 g chromu z tlenem otrzymano 14,6 g tlenku. Jaki tlenek otrzymano?

- A. czerwony tlenek chromu B. zielony tlenek chromu C. czarny tlenek chromu

Zadanie 10. (0-1 pkt.)

..... /1


Masa atomowa pierwiastka X jest dwa razy większa od masy atomowej pierwiastka Y. Jaka masa związku o wzorze XY powstanie w wyniku reakcji 100 g pierwiastka X z nadmiarem pierwiastka Y?

- A. 125 g B. 150 g C. 200 g D. 300 g

Zadanie 11. (0-1 pkt.)

..... /1

Poniższy schemat przedstawia budowę:



- A. cząsteczki B. anionu C. kationu D. atomu

Zadanie 12. (0-1 pkt.)

..... /1


Podczas przemiany β^-

- A. proton zamienia się w neutron
- B. elektron zamienia się w proton
- C. elektron zamienia się w neutron
- D. neutron zamienia się w proton

Zadanie 13. (0-1 pkt.)

..... /1

Poniższy rysunek przedstawia schematyczny rzut na płaszczyznę drobin tworzących:



- A. związek kowalencyjny o wzorze sumarycznym CaCl
- B. związek jonowy o wzorze sumarycznym CaCl
- C. związek kowalencyjny o wzorze sumarycznym CaCl_2
- D. związek jonowy o wzorze sumarycznym CaCl_2

Zadanie 14. (0-1 pkt.)

..... /1

Który z niżej wymienionych pierwiastków lub związków chemicznych nie przewodzi prądu elektrycznego w stanie stopionym?

- A. $\text{KNO}_{3(c)}$
- B. $\text{Mg}_{(c)}$
- C. $\text{Na}_2\text{O}_{(c)}$
- D. $\text{Se}_{(c)}$

Zadanie 15. (0-1 pkt.)


..... /1

Który z poniższych zapisów przedstawia poprawnie zbilansowane równanie reakcji chemicznej?

- A. $\text{Pb}_3\text{O}_4 + 4\text{CO} \rightarrow 3\text{PbO} + 4\text{CO}_2$
- B. $3\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + 2\text{MnO}_2 + \text{O}_2$
- C. $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$
- D. $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Zadanie 16.

Poniższy schemat przedstawia walce wykonane z różnych pierwiastków. Wszystkie walce mają takie same średnice, różnią się jednak wysokością. Walce zostały wykonane w taki sposób, by w każdym znajdowała się dokładnie taka sama liczba atomów danego pierwiastka wynosząca jeden kwadrylion. Załóżmy, że w każdej próbce atomy upakowane są w taki sam sposób, ściśle do siebie przylegając.



Zadanie 16.1. (0-1 pkt.)

..... /1

Analizując powyższy rysunek oraz korzystając z danych zawartych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych możemy sformułować szereg wniosków na temat masy poszczególnych walców. Odpowiedz na poniższe pytania:

- a) Który walec ma największą masę? _____
- b) Ile razy cięższy jest walec wykonany z siarki w porównaniu z walcem wykonanym z magnezu? _____

Zadanie 16.2. (0-1 pkt.)

..... /1

Analiza powyższego rysunku pozwala na sformułowanie szeregu wniosków na temat objętości (wielkości) atomów wymienionych pierwiastków. Rozwiąż poniższe problemy:

- a) Uporządkuj przedstawione pierwiastki względem wzrastającego rozmiaru atomu.

_____ < _____ < _____ < _____

- b) Podaj nazwę lub symbol jednego z pierwiastków przedstawionych w zadaniu, którego 1 cm³ będzie zawierał najmniej atomów.

Zadanie 16.3. (0-1 pkt.)

..... /1

Uzupełnij poniższe zdania. Otocz pętlą jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Pierwiastek charakteryzuje się tym większą gęstością, im jego atomy mają (*większą / mniejszą*) masę i (*większą / mniejszą*) objętość. Wynika z tego, że spośród przedstawionych pierwiastków największą gęstość ma (*magnez / siarka / platyna / potas*).

Zadanie 17. (0-2 pkt.)

..... /2

Analizując położenie astatu w układzie okresowym pierwiastków określ najbardziej prawdopodobne właściwości astatu. Spośród właściwości podanych poniżej (I – V) wybierz po jednej z każdego punktu i otocz ją pętlą.

I.	Stan skupienia	ciało stałe	ciecz	gaz
II.	Barwa	może mieć kolor	bezbarwny	
III.	Toksyczność	toksyczny	nietoksyczny	
IV.	Stabilność	promieniotwórczy	trwały	
V.	Aktywność chemiczna	aktywniejszy od jodu	mniej aktywny od jodu	

Zadanie 18. (0-2 pkt.)

..... /2

Elektroujemność jest parametrem, którego wartość liczbową można obliczać na różne sposoby – korzystając z różnych wzorów definicyjnych, stąd istnieją różne skale elektroujemności. Zgodnie ze skalą elektroujemności wg Paulinga (1932 r.) największą elektroujemność ma fluor ($\chi = 4,0$), najmniejszą – franc (złoty) ($\chi = 0,7$). Z kolei elektroujemność wg skali wprowadzonej przez Mullikena (1935 r.) może przyjmować wartości od 0,50 (dla rubidu) do 3,90 (dla fluoru).

Na podstawie: A. Bielański, *Podstawy Chemii Nieorganicznej*,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 144–146

Poniżej przedstawiono elektroujemności wg Mullikena dla czterech pierwiastków: X, Y, Z i W (litery te nie są prawdziwymi symbolami pierwiastków):

Pierwiastek	X	Y	Z	W
Elektroujemność wg Mullikena	0,77	1,17	2,95	3,04

Korzystając z przedstawionych informacji oceń prawdziwość podanych zdań. Otocz pętlą literę **P** – jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę **F** – jeśli zdanie jest fałszywe.

Zdanie			
1.	Pierwiastek X to niemetal.	P	F
2.	Pierwiastki X i Y tworzą związek jonowy.	P	F
3.	Pierwiastki Z i W tworzą związek kowalencyjny.	P	F
4.	Pierwiastek Y dobrze przewodzi prąd elektryczny.	P	F

Zadanie 19. (0-2 pkt.)

..... /2


Oceń prawdziwość podanych zdań. Otocz pętlą literę **P** – jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę **F** – jeśli zdanie jest fałszywe.

	Zdanie		
1.	Węgiel jest pierwiastkiem klasyfikowanym jako niemetal, ponieważ atomy węgla są ze sobą połączone wiązaniami kowalencyjnymi.	P	F
2.	W cząsteczce tlenku węgla(IV) atomy tlenu są połączone z atomem węgla czterema pojedynczymi wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi.	P	F
3.	Temperatura wrzenia cząsteczki wody wynosi 100 °C.	P	F
4.	Gęstość próbki wody podwoi się, gdy podwoimy jej masę.	P	F

Zadanie 20.

Pewne dwa leki: A oraz B są nietrwałe i po dłuższym przechowywaniu ulegają rozkładowi. Szybkość rozkładu tych leków można opisać za pomocą prawa rozpadu naturalnego. Mówi ono, że po pewnym ściśle określonym czasie, zwanym czasem połowicznego rozpadu, lub czasem połowicznego zaniku, połowa leku ulega rozkładowi. Następnie, po kolejnym czasie połowicznego rozpadu, zanika połowa z tej połowy która pozostała itd...

Poniżej przedstawiono schematycznie próbki leków A i B, z zaznaczeniem liczby cząsteczek aktywnych form leku w próbce. Formy nieaktywne (cząsteczki które uległy rozpadowi) nie zostały na schematach oznaczone.



Zadanie 20.1. (0-2 pkt.)

..... /2


Analizując powyższe schematy określ, ile wynosił czas **T1** (dla leku A) i czas **T2** (dla leku B).

T1	T2

Zadanie 20.2. (0-1 pkt.)

..... /1

Poniżej przedstawiono wykres zależności liczby aktywnych cząsteczek pewnego leku w próbce. Określ, czy szybkość rozkładu cząsteczek leku jest zgodna z prawem rozpadu naturalnego, czy opisana jest inną zależnością matematyczną. Uzasadnij swoje stanowisko.



Ocena oraz uzasadnienie: _____

Zadanie 21. (0-1 pkt.)

..... /1

Dopasuj wymienione właściwości złota I – IV do jego zastosowań A – D.


Zastosowanie złota		Właściwości złota	
A	W stomatologii jako amalgamat.	I	Świetnie przewodzi prąd elektryczny.
B	W jubilerstwie.	II	Odporny chemicznie.
C	Pozłacane styki i złącza w elektronice.	III	Odbija promieniowanie ciepłne.
D	Ochrona hełmów astronautów.	IV	Rzadko występujący metal

A	B	C	D

Zadanie 22. (0-2 pkt.)

..... /2

Cylinder miarowy napełniono całkowicie (aż po samą górną krawędź) etanolem ($d_{\text{etanol}} = 0,789 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$). Napełniony cylinder zważono. Następnie do cylindra wrzucono ostrożnie pręt wykonany z nieznanego stopu metali o masie 18,7 g. Część etanolu wylała się z cylindra. Po wytarciu ścianek cylindra i powtórным zważeniu okazało się, że masa cylindra wzrosła o 13,9 g. Wyznacz gęstość stopu, z którego wykonano pręt. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.




Obliczenia:

Zadanie 23. (0-3 pkt.)

..... /3

Poniżej przedstawiono zbilansowane równanie pewnej reakcji, gdzie X, Y, Z i W to substancje nieorganiczne.



Stosunek masowy reagentów biorących udział w reakcji wyraża się następująco:

$$m_X : m_Y : m_Z : m_W = 8\frac{3}{4} : 1 : 5\frac{3}{4} : 4.$$


Zidentyfikuj substancje X, Y, Z i W wiedząc, że reagentem o największej masie cząsteczkowej jest azotek litu Li_3N . Podaj tok swojego rozumowania przy identyfikacji azotku litu. Zapisz pełne, zbilansowane równanie przedstawionej reakcji.

Obliczenia:

Równanie reakcji: _____

Informacja do zadań 24 – 25.

Spektroskopia mas to technika pozwalająca na bardzo precyzyjne pomiary mas pojedynczych cząsteczek oraz atomów. W pierwszym etapie próbka pierwiastka lub związku chemicznego bombardowana jest silnie rozpędzonymi elektronami, fotonami lub jonami, w wyniku czego z próbki wybijane są zjonizowane atomy lub cząsteczki (tj. pozbawione elektronu). Drobiny te są następnie przyspieszane w polu elektrycznym. W dalszej kolejności wpadają one w pole magnetyczne. Powoduje ono odchylenie torów lotu jonów, przy czym odchylenie to jest tym większe, im lżejszy jest dany jon. Rozdzielone względem masy strumienie zjonizowanych atomów zderzają się następnie z detektorem, który zlicza poszczególne jony.




Wyniki analizy spektrometrycznej przedstawiane są na tzw. spektrogramie, gdzie na osi x odkłada się masy poszczególnych atomów (masy atomów i utworzonych z nich kationów są praktycznie identyczne – masę elektronu można pominąć), a na osi y względną intensywność sygnału, która jest wprost proporcjonalna do liczby zarejestrowanych drobin o danej masie.

Na podstawie: P. Atkins, J. de Paula, *Chemia Fizyczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 747

Zadanie 24.1. (0-1 pkt.)


..... /1

W trakcie bombardowania próbki pierwiastka X fotonami lub rozpędzonymi elektronami (etap jonizacji) część atomów nie ulega jonizacji, jedynie odrywa się z powierzchni próbki przechodząc do fazy gazowej:



Jak nazywamy proces przechodzenia substancji z fazy stałej bezpośrednio do fazy gazowej?

Poniżej przedstawiono spektrogram jaki uzyskano podczas badania omawianej próbki wody:



Zadanie 25.1. (0-1 pkt.)

..... /1

Wyjaśnij, dlaczego na spektrogramie widocznych jest jedynie 5 pików (sygnałów), skoro w próbce wody można było znaleźć 6 różnych indywiduów chemicznych (cząsteczek)?

Zadanie 25.2. (0-1 pkt.)

..... /1


Przypisz wzory cząsteczek wody, z uwzględnieniem ich składu izotopowego, do pików obserwowanych na spektrogramie. Uzupełnij poniższą tabelę.

	Pik 1	Pik 2	Pik 3	Pik 4	Pik 5
Wzory indywiduów					

Zadanie 25.3. (0-1 pkt.)

..... /1

W trakcie jonizacji próbki wody powstał m.in. jon o następującym wzorze:



Określ liczbę protonów, neutronów i elektronów w tym jonie. Uzupełnij poniższą tabelę.

Liczba protonów	Liczba neutronów	Liczba elektronów

[illegible]

† Lantanowce	⁵⁷ La lantan 138,9	⁵⁸ Ce cer 140,1	⁵⁹ Pr prazeodym 140,9	⁶⁰ Nd neodym 144,2	⁶¹ Pm promet 144,9	⁶² Sm samar 150,4	⁶³ Eu europ 152,0	⁶⁴ Gd gadolin 157,3	⁶⁵ Tb terb 158,9	⁶⁶ Dy dysproz 162,5	⁶⁷ Ho holm 164,9	⁶⁸ Er erb 167,3	⁶⁹ Tm tul 168,9	⁷⁰ Yb iterb 173,0	⁷¹ Lu lutet 175,0
	⁸⁹ Ac aktyn 227,0	⁹⁰ Th tor 232,0	⁹¹ Pa protaktyn 231,0	⁹² U uran 238,0	⁹³ Np neptun 237,1	⁹⁴ Pu pluton 244,1	⁹⁵ Am ameryk 243,1	⁹⁶ Cm kiur 247,1	⁹⁷ Bk berkel 247,1	⁹⁸ Cf kaliforn 251,1	⁹⁹ Es einstein 252,1	¹⁰⁰ Fm ferm 257,1	¹⁰¹ Md mendelew 258,1	¹⁰² No nobel 259,1	¹⁰³ Lr lorens 262,1